

Dott. Edgardo Moltoni

---

OSSERVAZIONI SUI *PUFFINUS*  
RACCOLTI DAL CAPITANO LOCHE IN ALGERIA

---

Nel ristudiare gli esemplari di *Puffinus*, raccolti in Algeria negli anni 1840-41-42 dal Capitano Loche, e dallo stesso illustrati in « Catalogue des Mammifères et des Oiseaux observés en Algérie », e nel II volume della « Exploration scientifique de l'Algérie », ho fatto alcune importanti osservazioni, che credo opportuno notificare; e ciò non solo per far considerare nel suo vero valore scientifico, sia il Loche, sia la raccolta da lui riunita, ma soprattutto per stabilire con precisione di quali specie di Puffini egli intenda parlare nelle suddette opere, essendovi in proposito pareri disparati e confusione.

La Raccolta del Loche, tuttora in ottimo stato di conservazione, venne a far parte della Collezione Turati nel 1878.

I Puffini catturati e conservati in Raccolta appartengono a quattro specie:

1. *Puffinus gravis* (O' Reilly).

Il Loche a p. 107 del « Catal. Mamm. Ois. observés en Algér. » e a p. 174 della « Expl. Sci. Algér. Ois. II. » cita giustamente come di passaggio accidentale in Algeria, col nome di *Puffinus major*, Faber (sinonimo di *P. gravis*), questa Berta, basandosi su di un ♂ ad. catturato a Pointe Pescade.

Il Salvin nel « Cat. Birds Brit. Mus., vol. XXV, p. 375 », considera, errando, il *P. Major* del Loche come sinonimo di *P. kuhlii* (Boie); la stessa cosa crede pure il Godman in « Monograph of the Petrels, p. 94. London, 1907-10 ».

La Raccolta del Loche, inglobata nella Raccolta generale del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, contiene il suddetto *P. major*, Faber, portante il numero di catalogo 17791<sup>a</sup>,

e l'indicazione *Expl. Algér., II, p. 173*. Esso è un esemplare tipico di Berta dell'Atlantico (*P. gravis*) e simile in tutto ad un altro esemplare ♂, catturato a Lichtenfels (Groenlandia) nell'Agosto del 1876.

Il *P. gravis* si rinviene normalmente nell'Oceano Atlantico dalle isole Fär Öer e dalla Groenlandia fino al Capo di Buona Speranza ed alle isole Falkland. Nel bacino del Mediterraneo fu catturato almeno due volte; una dal Loche sulle coste dell'Algeria e l'altra sulle coste della Sardegna sett. presso Alghero (1).

## 2. *Puffinus griseus* (Gm.).

Di questo *Puffinus* — elencato col nome di *P. cinereus*, Bp. in « *Expl. Sci. Algér.* », e di *P. arcticus*, Bp. in « *Cat. Mamm. Ois. observés en Algér.* » — il Loche scrive in quest'ultima opera che si riscontra accidentalmente sulle coste dell'Algeria.

Anche questa specie è citata dal Salvin (Op. cit. p. 375) come sinonimo di *P. kuhlii* (Boie). In verità i due individui, ♂ e ♀, considerati dal Loche come *P. cinereus*, Bp., e da lui catturati in Algeria, sono esemplari tipici di *P. griseus* (Gm.) e non di *P. kuhlii*, nè di *P. cinereus*, quantunque nella *Expl. Sc. d'Algér.*, p. 174 egli dia realmente sotto il nome di *P. cinereus*, la descrizione del *P. kuhlii*.

Secondo l'Hartert (Die Vögel der paläarktischen Fauna, p. 1427) il *P. griseus* (Gm.) fu catturato ripetutamente presso le isole Curili nell'Oceano Pacifico, nel nord dell'Oceano Atlantico presso le isole Fär Öer ed in Norvegia; non è raro sulle coste irlandesi ed inglesi, presso il Portogallo e sulle spiagge dell'America settentrionale dal Golfo di S. Lorenzo fino alla Carolina meridionale. Fu catturato una volta, tanto presso l'Isola Fernando Po, quanto sulla costa di Angola e presso Landana alle foci del Congo. Nell'emisfero meridionale non raramente fu catturato nei mari intorno al Sud Africa, e così pure dal Cile fino all'Australia, alle isole Chatham ed Auckland.

---

(1) Confronta MARTORELLI, *Ucc. d'Italia*, p. 81 e nota. — E. H. GIGLIOLI, *Avifauna Italica, Secondo resoconto*, p. 666-67.

A quanto sopra bisogna dunque aggiungere che due individui furono catturati anche nel bacino del Mediterraneo e precisamente nella rada di Algeri (Loche) (1).

### 3. *Puffinus kuhlii kuhlii* (Boie).

Il *Puffinus kuhlii*, Boie, citato dal Loche (Cat. Mamm. Ois. observés en Algér., p. 108) ed esistente in raccolta, appartiene alla sottospecie *P. kuhlii kuhlii* (Boie), quantunque venisse più tardi passato erroneamente dal Loche stesso (Expl. Sci. Ois. Algér., p. 176) in sinonimia di *P. yelkouan*.

### 4. *Puffinus puffinus yelkouan* (Acerbi).

Il *Puffinus obscurus*, citato dal Loche nelle suddette opere ed esistente in raccolta col nome di *P. obscurus*, non è altro che un esemplare di *P. puffinus yelkouan* (Acerbi), perciò il *P. obscurus* del Loche si deve considerare come sinonimo di *P. puffinus yelkouan* (Acerbi) e non di *P. obscurus* (Gm.), come è stato indotto a fare il Salvin nel « Cat. Birds Brit. Mus. a p. 382 ».

Da quanto ho sopra esposto risulta che nella Collezione del Loche, contenenti gli Uccelli raccolti nella esplorazione scientifica fatta in Algeria negli anni 1840-41-42, esistono: un esemplare di *P. gravis* (O' Reilly), due di *P. griseus* (Gm.), due di *P. kuhlii kuhlii* (Boie) (2) ed uno di *P. puffinus yelkouan* (Acerbi); perciò, tanto il *P. gravis*, quanto il *P. griseus* sono da considerarsi come di comparsa accidentale anche per il bacino del Mediterraneo.

Milano, Gennaio 1924.

---

(1) Vedi MARTORELLI, *Op. cit.*, p. 81.

(2) Uno di questi esemplari porta l'indicazione di essere stato catturato nel Mare Mediterraneo, e quindi non si può sapere con precisione se fu catturato realmente sulle coste dell'Algeria.

---